

流行性感冒預防注射

一、主要症狀：發燒、咳嗽、肌肉/關節酸痛，嚴重者則會有腸炎肺水腫等併發症，甚至死亡。

二、高危險群：

- (一) 慢性呼吸道疾病、氣喘、心臟病、腎衰竭、糖尿病及代謝異常疾病和因疾病或治療所致之免疫抑制患者。
- (二) 老年人及幼童。
- (三) 經常出入醫療院所或安養、養護機構或其他長期處於易快速傳染流行性感冒環境者。高危險群
- (四) 過團體生活者，如學校、幼稚園、療養院及老人院等。
- (五) 經常出差旅遊者。

三、預防方式：

- (一) 避免於流行性感冒爆發時出入公共場所。
- (二) 避免接觸已受感染者。
- (三) 平日維持良好健康狀況。
- (四) 保持良好的作息均衡的飲食適度的運動。
- (五) 施打流行性感冒疫苗。



四、注意事項：

- (一) 懷孕及三歲以下嬰兒及對蛋過敏者不宜接種。
- (二) 嚴重發熱性感染及慢性進行性疾病宜延後接種。
- (三) 同其它預防注射，可能引起局部反應，極少有過敏性反應及神經系統紊亂者。
- (四) 對 Neomycin (新黴素) 過敏者，須小心使用。

新泰綜合醫院 關心您！