

包皮環切手術後之注意事項

一、局部麻醉：

- (一) 手術後的傷口稍微腫脹是正常的，小孩覆蓋保護傷口的小藥杯使用一天後可丟棄。
- (二) 傷口處周圍可冰敷（冰塊包毛巾），以減疼痛及腫脹。
- (三) 傷口保持清潔乾燥，每次小便後用小棉籤沾優碘藥水清擦傷口。
- (四) 需穿著較寬鬆、質料軟的棉質內褲、外褲，儘量避免穿著牛仔褲。
- (五) 按照醫囑，按時服藥，以減輕傷口疼痛。
- (六) 手術後的5~7天，請勿用泡浴，可採用擦澡或淋浴。
- (七) 術後若有勃起現象，可用手握住陰莖壓迫數分鐘，避免縫線脫落。
- (八) 如有傷口大量出血、紅腫厲害、灼熱或疼痛、有分泌物出現或發燒的情形，應即刻返院處理。

二、全身麻醉：

- (一) 術後會先送到恢復室，由專責醫療人員照護。
- (二) 手術後因麻醉，用藥病患偶有發燒至攝氏38~38.5度。
- (三) 傷口護理如前所載”局部麻醉注意事項”。

新泰綜合醫院 關心您！